

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

## ÉDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

11, Rue de la Vigilance — 69 - LYON-3<sup>e</sup>

Tél. 60-66-24 et 60-69-55

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

C.C.P. LYON 9431-17

Régisseur Avances et Recettes D.D.A.

51, Av. Maréchal-Foch - LYON-6<sup>e</sup>

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

Bulletin N° 97 d'octobre 1968

16 octobre 1968

page 32

### INFORMATIONS

#### ARBRES FRUITIERS

TRAITEMENTS FONGICIDES D'AUTOMNE - Ces traitements, effectués pendant la chute des feuilles, sont dirigés contre le chancre européen du pommier, les chancres bactériens du poirier et du cerisier, le coryneum du cerisier et du pêcher et la cloque du pêcher. Ils ne dispensent pas des traitements de printemps conseillés contre certaines de ces maladies. Sur framboisier, ils sont également utiles, mais doivent s'accompagner de la suppression des rameaux atteints de l'antracnose ou de didymella.

On utilisera un produit cuprique à raison de 500gr/hl de cuivre métal sur arbres fruitiers, de 300gr/hl au maximum sur framboisier.

#### COLZA

DESHERBAGE DE POST-EMERGENCE - Deux produits peuvent être employés: le Trichloracétate de soude ou T.C.A. et le Dalapon. Le premier de ces herbicides ne détruit que le vulpin jeune avant tallage; il doit être utilisé sur sol humide avant les fortes gelées nocturnes, lorsque le colza a atteint le stade 2 - 3 feuilles vraies en plus des cotylédons, à la dose de 5 à 7 kgs de matière active à l'hectare en pulvérisant au moins 400 litres de bouillie à l'ha.

Le Dalapon présente l'avantage sur le T.C.A. d'être efficace sur le vulpin déjà tallé, le ray-grass (souvent abondant dans les départements de l'Ain et de l'Isère) ainsi que sur les repousses de céréales. On l'utilise lorsque les graminées sont bien levées jusqu'au stade "rosette" du colza à la dose de 1,8 à 2,5 kg de matière active à l'ha; débit du pulvérisateur de 300 à 500 litres. Les traitements tardifs augmentent la sensibilité au froid du colza.

Avec ces deux herbicides, le temps nécessaire pour que les graminées soient entièrement détruites est assez long et il faut souvent attendre la sortie de l'hiver pour constater la disparition des mauvaises herbes.

#### CEREALES

DESINFECTION DES SEMENCES - Aux produits mentionnés dans le bulletin du 25 septembre (page 31), il y a lieu d'ajouter l'Oxathiine qui bénéficie d'une autorisation de vente pour lutter contre le Charbon nu de l'orge.

#### CONCOURS DE DETECTION DES MALADIES DE LA VIGNE

Les personnes mentionnées ci-dessous bénéficieront d'un abonnement gratuit au "bulletin technique" et à la revue "Phytoma" pour l'année 1969:

AIN - GUILLON Alexandre, Amareins par Montmerle,	région 43
PERRIN Léon, Coron à Belley	région 52
GENIN Paul, Cornelle à Jujurieux	région 46
LACHENAL Robert à Arbignieu	région 52

747

ARDECHE -	GRIPPAT J.L. La Pichonnière, Tournon	région 142
	RAVEL Jean, St Jean de Muzols	région 141
	GRIPA Henri, Mauves	région 142
DROME -	POUCHOULIN J. à Allex	région 133
ISERE -	Néant	
LOIRE -	Néant	
RHONE -	CHOL Vincent, la Chapelle à Quincieux	ex-région 38
	DESMOLLES J.C., Blaceret, Blacé	région 35
	GIRAUDON François, Morancé	région 36
	FARGEOT Maurice, Pommiers	région 36
	Mme DUPLANT Magdeleine, Corcelles	région 37
	GOMET Jean, St Etienne des Oullières	région 35
ex-aequo-	VERMOREL Georges, St Etienne des Oullières	région 35
	COULAS Léon, la Granelle, Chiroubles	région 34
	DEBUIIS Antoine, La Chapelle, Quincieux	ex-région 38
	LEOS Claude, Belleville s/Saône	région 37
	LARDET Jean, le Mathias, Limonest	région 23
	PIERRON Pierre, la Roche, Chatillon d'Az.	région 33
SAVOIE -	BERTRAND Aimé à Belmont-Tramonet	région 82
HTE SAVOIE-	GILLIOZ Joseph, Prailles-Sciez	région 64

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux  
A.PITHIoud

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements agricoles  
P.LATARD

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes  
Directeur-gérant: L.BOUYX